

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Marktäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
ABIES	<i>Granar av släktet Abies har genomgående stammar och upprätta kottar. Barken är slätare och barren mjukare än hos Picea. Trivs i väl-dränerade jordar med god närings- och fuktillgång. Trivs generellt bäst i sol.</i>															
- balsamea 'Nana'	1-5	1/2		●				●	●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	små mörkgröna barr
- concolor	1-5	15-20/6-8							●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	stora blågröna barr, upprättsittande blågröna kottar
- koreana	1-4	4-6/2		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, vit undersida, upprättsittande blå kottar
- koreana FK ULTUNA E	1-5(6)	5-7/2		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	bättre växtsätt och blåare kottar än Abies koreana
- lasiocarpa var. arizonica 'Compacta'	1-6	3/2						●	●		●	måttligt näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	blågröna barr, doftande
- nordmanniana	1-4	20-25/5,5-7							●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, vit barrundersida
- sibirica	3-7	20-30/6-8							●			måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr. Får ofta flera toppar. Växer långsamt som ung
- veitchii	1-5	10-15/3-5							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr m. silvervit undersida, purpurfärgade kottar
CEDRUS	<i>Trots sin begränsade hårdighet är cedrar värdefulla odlingsvärda träd. De är mycket torktåliga och värmegynnade, idealiska för miljöer med hårdgjorda stenlagda ytor och värmelagrande bebyggelse.</i>															
- atlantica (Glauca-Gruppen)	1	10-15/6-10							●			näringsrik	○	torr-fuktig	snabb	silverblågrå barr, upprättsittande grå-purpurfärgade kottar
CHAMAECYPARIS	<i>Chamaecyparis är ett släkte av oftast konformade växter med mjuk framtoning. Till mjukheten bidrar dels de mjuka platta skotten, dels att såväl topp som grenspetsar nickar en aning. Barren är flata, fjällika och ligger med överlappning på skotten. Kottarna är små, klotformade och uppsprickande. Chamaecyparis trivs i ljusa lägen och de flesta trädgårdsjordar. En väl-dränerad mull- och näringsrik jord är idealisk.</i>															
- lawsoniana 'Alumii'	1-3	8-10/2,5-3		●		●			●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	blågröna barr, små runda kottar, kägelformad
- law. 'Aurea Dömmesmoen'	1-4	3-5/3-5							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	mjuka gula barr, hängande skottspetsar
- lawsoniana 'Columnaris'	1-2	8-10/1-2				●			●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	stålblå barr, pelarformad
- lawsoniana 'Kelleriis'	1(-2)	6-8/1-2							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	guldgröngula barr, kägelformad
- lawsoniana 'Minima Glauca'	1-2	1/1		●					●		●	näringsrik	○●	fuktig	långsam	blågröna barr, klotformad
- nootkatensis 'Aurea'	1-3	8-10/2-2,5							●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	ljusgula barr, kägelformad
- nootkatensis 'Glauca'	1-4	10-15/4-5							●	●	●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	blågröna barr, kägelformad
- nootkatensis 'Pendula'	1-4	8-10/2,5-3,5							●	●	●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, kandelaberlika hängande grenar
- obtusa 'Nana Gracilis'	1-3	1-2/1-1,5		●					●		●	näringsrik	○●	fuktig	långsam	mörkgröna barr, dvärgform med dekorativt växtsätt
- pisifera 'Fillifera'	1-3	3/2		●					●		●	fattig-näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	gröna barr, hängande grenar
- pisifera 'Fillifera Nana'	1-3	1-2/1-2		●					●		●	fattig-näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, kompakt växtsätt med hängande grenar
- pisifera 'Sungold'	1-2	1,5-2/1,5							●		●	näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gulgröna hängande barr, kompakt rundat växtsätt
GINKGO	<i>Ett levande fossil som ger ett exotiskt intryck. Värmegynnad och trivs bra i stadsmiljö. Kalktolerant. Större exemplar generellt hårdigare. Helst planteras hanträd då honträd får fetthaltiga frukter som dels utgör halkrisk, dels luktar mycket illa när fetterna bryts ner. Arten är mångformig och ett stort antal namnsorter finns.</i>															
- biloba	1-2	12-15/8-11							●	●		måttligt näringsrik	○●	frisk	långsam	ljusgröna sammanvuxna barr, gul höstfärg
JUNIPERUS	<i>Släktet Juniperus består av krypande, lågt utbredda och högt upprätta sorter. De pelarformade sorterna är arkitektoniskt värdefulla. Enarnas former och skimrande barr i olika toner av grönt, silver och blått är utmärkta för kombinationer med rosor, perenner, prydnadsgräs och andra buskar och träd. Läget bör vara ljust och soligt, däremot är de flexibla när det gäller jorden. Enar trivs i alla jordar utom de allra tyngsta och fuktigaste.</i>															
- communis FARVILL E	1-6	1-1,5/1-1,5		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	friskt gröna barr, brunaktiga under vintern. Tål snöbelastning

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Markäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
JUNIPERUS forts.																
- communis 'Fontän'	1-5	1-2/1-2		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	gröna barr, silvervit barrundersida, överhängande växtsätt
- communis 'Green Carpet'	1-4	0,2-0,3/1,5-2					●					fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	gröna barr, kompakt mattbildande växtsätt
- communis 'Hibernica'	1-3	3-5/1-1,2		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	gröna barr, silvervit barrundersida, pelarformad
- communis 'Hornibrookii'	1-5	0,4/1,5-2					●				●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	ljusgröna barr, kompakt mattbildande växtsätt
- communis 'Meyer'	1-4	3/1-1,5		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	blågröna barr, silvervit barrundersida, pelarformad
- communis NONA® HUSTAD E	1-5	0,3-0,5		●			●				●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	ljusgröna barr, mycket frisk sort, ersätter 'Tyrihans'
- communis 'Oskekladden' E	1-5	3/0,5-0,8		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	gröna barr med silveranstrykning, frisk, tål snöbelastning
- communis 'Repanda'	1-5	0,3/2-2,5		●			●		●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	mörkgröna barr, brungröna barr vintertid, kompakt dvärgform
- communis f. suecica	1-5(6)	5-7/1-1,6		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	ljusgröna barr, silvervit barrundersida, pelarformad
- communis 'Vemboö' E	1-4(5)	3-5/0,5		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	ljusgröna barr, silvervit barrundersida, smalt pelarformad
- horizontalis 'Andorra Compact'	1-3(4)	0,5/1,5					●		●		●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	normal	gröna barr, rödbruna barr vintertid, lågt tätt utbredd växtsätt
- horizontalis ICEE BLUE®	1-3(4)	0,15/2		●			●				●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	blå barr, tätt växtsätt
- horizontalis 'Prince of Wales'	1-4	0,3/1,5					●				●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	blågröna barr, rödvioletta barr vintertid, mattbildande växtsätt
- horizontalis 'Wiltonii'	1-6	0,2/1,5-2		●			●				●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	stålblå barr, mattbildande växtsätt
- x pfitzeriana 'Gold Coast'	1-3	0,6-1/1,5-2	●	●			●				●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	guldgula barr, lågt utbredd växtsätt
- x pfitzeriana 'Mint Julep'	1-4	1,2-2/2,5-3,5	●								●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	normal	smaragdgröna barr, brett upprätt växtsätt
- x pfitzeriana 'Old Gold'	1-4	0,6-1/1,5-2	●	●			●				●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	bronsgula barr, lågt utbredd växtsätt
- x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea'	1-4	1,5-2/2-3							●		●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	snabb	gulgröna barr, utbredd växtsätt
- sabina	1-5	1-1,5/1,5-2	●								●	fattig-måttligt näringsrik	○●	torr-frisk	normal	gröna barr, vasformat växtsätt
- scopulorum 'Blue Arrow'	1-3	2-4/0,5-0,8		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	snabb	blågrå barr, smalt pelarformad
- squamata 'Blue Carpet'	1-5	0,1-0,3/0,5-1,5					●				●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	stålblå barr, dvärgformad med utbredd växtsätt
- squamata 'Blue Star'	1-5	0,5-1/1-1,5		●					●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	långsam	stålblå barr, kompakt rundat växtsätt
- squamata 'Hunnetorp'	1-4	2-4/2-4							●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	snabb	stålblå barr, vasformat växtsätt
- squamata 'Meyeri'	1-4	1-1,5/1-2							●		●	fattig-måttligt näringsrik	○	torr-frisk	normal	blågrå barr, upprätt asymmetriskt växtsätt
- virginiana 'Grey Owl'	1-4	1-1,5/2,5-3,5							●		●	fattig-näringsrik	○	torr-frisk	snabb	blågrå barr, utbredd tillplattad växtsätt

LARIX	Lärk blir i allmänhet stora och kraftiga träd med genomgående stam, men även kompakta former finns. De är barrträd, men behåller inte barren över vintern. Vårens nyutsagna barr är ljusgröna, under sommaren mörknar de och på hösten färgas de lysande gula. Lärken trivs bäst i näringsrik jord med tillgång till fukt. De uppskattar soligt läge. Lärk är fina solitärer där utrymme finns. De bildar också mycket stilliga klippta häckar.															
- decidua	1-6	15-20/7-9				●			●			näringsrik	○	frisk-fuktig	snabb	ljusgröna barr, gul höstfärg
- decidua 'Puli'	1-5	höjd = stamhöjd	●					●			●	näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr, hängande grenar
- kaempferi	1-4	15-20/6-9		●	●				●			näringsrik	○	fuktig	snabb	havsgroa barr, rödbruna grenar, tål klippning bra
- kaempferi 'Blue Dwarf'	1-4		●					●			●	näringsrik	○	fuktig	långsam	blåaktiga barr, kompakt tillplattad dvärgform
- kaempferi 'Grey Pearl'	1-4		●					●			●	näringsrik	○	fuktig	långsam	grågröna barr, kompakt dvärgform
- kaempferi 'Stiff Weeping'	1-4	höjd = stamhöjd	●					●	●		●	näringsrik	○	fuktig	långsam	blåaktiga barr, hängande växtsätt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklippt	Häck	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
LARIX forts.																
- sibirica	1-7	15-20/6-9				●			●	●		näringsrik	○	fuktig	snabb	grönblå barr
METASEQUOIA <i>Precis som Ginkgo är Metasequoia att betrakta som ett "levande fossil". Vetenskapligt beskriven först på 1940-talet i Kina. Törstig men bör inte planteras blött i vårt klimat. Djupa rötter söker sig neråt efter fukt. Faller barren på hösten. Ett förvånansvärt tufft träd, som börjar bli vanligare i både park- och stadsmiljö.</i>																
- glyptostroboides	1-3	12-15(20)/3,5-5							●	●		måttligt näringsrik	○●	torr-fuktig	snabb	ljusgröna barr, gul höstfärg
MICROBIOTA <i>Microbiota, kryptuja, är en mycket hårdig och anspråkslös marktäckare. Utvecklas relativt bra även på sandig näringsfattig jord. På vintern färgas barren brons eller purpurbruna.</i>																
- decussata	1-6	0,3-0,4/1-1,5	●	●			●				●	fattig - näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	smaragdgröna barr, bronsfärgade barr vintertid
- decussata 'Sibirteppe' E	1-6	0,3/1-1,5	●	●			●				●	fattig - näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, bronsbruna barr vintertid, lägre än arten i övrigt
PICEA <i>Gränar inom Picea-släktet är i allmänhet höga och koniska. De har stickande barr och hängande kottar. Rotsystemen är grunda och utbredda, vilket gör det svårt att etablera andra växter i deras omedelbara närhet. Träden är ljuskärvande och vill ha jord med god fuktillgång. Picea tål klippning så länge man inte klipper tillbaka till kala grenar.</i>																
- abies	1-8	25-50/6-8			●	●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	mörkgröna barr, hängande kottar, tål kraftig beskärning
- abies 'Little Gem'	1-6	0,3/1		●					●	●		måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, kompakt kuddliknande växtsätt
- abies 'Nidiformis'	1-7	1/1,5		●					●	●		måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, kompakt runt fågelbolkliknande växtsätt
- breweriana	1-2	7-9/3,5-4,5							●			måttligt näringsrik	○	fuktig	långsam	mörkgröna barr, brett kägelformigt växtsätt
- glauca	1-6	12-15/3-5				●			●	●		måttligt näringsrik	○●	fuktig	normal	gröna-blågrå barr, pyramidalt växtsätt
- glauca 'Conica'	1-5	2-3/1-1,5		●					●	●		måttligt näringsrik	○●	fuktig	långsam	gräsgröna barr, dvärgform med koniskt växtsätt
- glauca 'Echiniformis'	1-5	0,5/0,8-1		●					●	●		måttligt näringsrik	○	fuktig	långsam	silvrigt grågröna barr, dvärgform m. halvklotformat växtsätt
- 'Karel'	1-5	0,4/0,7		●					●	●		måttligt näringsrik	○●	frisk	långsam	mörkt grågröna barr, kompakt vacker dvärgform
- omorika	1-5	15-20/2,5-3,5				●			●			fattig - näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	gröna barr
- omorika 'Nana'	1-4	2-3/1,5		●					●	●		fattig - näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr med vita ränder, dvärgform m. brett tätt växtsätt
- pungens	1-6	15-20/6-8							●			näringsrik	○	frisk-fuktig	normal	blågröna barr, ljusbruna kottar
- pungens Glauca-Gruppen	1-6	12-15/4-6							●			näringsrik	○	frisk-fuktig	snabb	stålblå barr, pyramidalt växtsätt
- pungens (Glauca-Gruppen) 'Fat Albert'	1-5	3-4/2-3		●					●	●		näringsrik	○	frisk-fuktig	normal	silverblå barr, kompakt pyramidalt, växer långsamt som ung
- pungens (Glauca-Gruppen) 'Glauca Globosa'	1-6	1,5-2/2-3		●					●	●		näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	blåaktiga barr, kompakt rundat växtsätt
- pungens (Glauca-Gruppen) 'Hoopsii'	1-6	12-15/3-4,5							●			näringsrik	○	frisk-fuktig	snabb	silvrigt blågrå barr, tätt pyramidalt växtsätt
PINUS <i>Pinus-släktet innehåller allt från låga buskar till höga träd. Barren sitter två, tre eller fem tillsammans. Trädformade tallar får luftiga, oregelbundna kronor. Det går i allmänhet bra att etablera andra växter under tallar eftersom kronorna släpper igenom mycket ljus och rötterna växer rakt ner. Tallar är ljuskärvande. De är anspråkslösa när det gäller jorden, men den bör vara väl-dränerad. Tål torka.</i>																
- cembra	1-7	15-20/4-5							●	●		fattig-näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	mörkt blågröna barr
- heldreichii	1-4	8-12/5-7							●	●	●	fattig - näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	svartgröna barr, koboltblå kottar
- mugo	1-6	6-9/4-5	●			●				●		fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr, bruna kottar
- mugo 'Mops'	1-5	0,5-1,5/1		●					●	●		fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr, dvärgform med rundat växtsätt
- mugo ssp. mugo	1-7	2-3(4)/2-3	●			●			●	●		fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr
- mugo var. pumilio FK SAUHERAD	1-6	1-1,5/2		●			●			●		fattig - näringsrik	○●	torr-fuktig	långsam	mörkgröna barr

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklipp	Häck	Markäckare	Småträd	Sollitår	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
PINUS forts.																
- nigra	1-4	20-25/8-10							●			näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr
- parviflora 'Glauca'	1-3	5-8/4-6							●		●	måttligt näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	blågröna-silvriga vridna barr
- sylvestris	1-7	15-20/6-8							●	●		fattig-näringsrik	○	torr-fuktig	normal	blågröna-grågröna barr, gråbruna kottar
- sylvestris 'Watereri'	1-5	2-3/2,5-3		●					●		●	fattig-näringsrik	○	torr-fuktig	långsam	gråblå-stålblå barr

TAXUS	För växtanvändaren finns det inget tacksammare släkte bland barrväxterna än Taxus. Bästa egenskaperna är förmågan att växa i full sol till djupaste skugga. De har en stark konkurrensförmåga även under stora träd samt att de tål hård klippning. De är dessutom mycket långlivade. De växer bra på de flesta jordar, trivs dock inte på kompakta ogenomsläppliga jordar eller vid riktigt lågt pH. Kräver regelbunden gödsling. Det finns många olika växtsätt i sortimentet, från utbredda och buskiga till pelartyper och även gulbarriga.															
- baccata	1-(2)	5-7/6-8			●	●			●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, röda frukter
- baccata 'Columna Suecica' E	1-2(3)	3-4/1							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, sparsamt med röda frukter, tätt pelarformad
- baccata 'Fastigiata Aurea'	1-2	3-5/1,5-2,5							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr med gul rand, pelarformad
- baccata 'Repandens'	1-4	0,3-0,5/1,5-2	●				●				●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	röda frukter, lågt horisontellt växtsätt
- baccata 'Summergold'	1-4	0,6-1/1,2-2,5	●				●		●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	guldgula barr, hanklon, lågt horisontellt växtsätt
- cuspidata var. nana	1-5	0,5-1,5/1-2	●		●	●			●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	röda frukter, dvärgform, oregelbundet rundat växtsätt
- x media 'Adams'	1-4(5)	2-3/3				●			●			måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	ljusgröna barr, upprätt växtsätt, horis. grenar, hanklon
- x media 'Brownii'	1-4	1,5-2/2-3	●								●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, tätt rundat växtsätt, hanklon
- x media 'Densiformis'	1-3	1-1,5/2-3	●								●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, röda bär, brett växtsätt, honklon
- x media 'Farmen'	1-5	1-2/2-3	●			●					●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mellangröna barr, brett buskigt växtsätt, hanklon
-x media 'Green Mountain'	1-5	1,5/2-3	●			●					●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mellangröna barr, brett buskigt växtsätt, vital hanklon
- x media 'Hicksii'	1-4	3-5/3-4							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, stora röda frukter, vasformat växtsätt, honklon
- x media 'Hillii'	1-5	2-3/1,5-2				●			●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, tätt kompakt växtsätt, hanklon
- x media 'Viridis'	1-4	2-3/0,4-0,8							●		●	måttligt näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr, pelarformad

THUJA	Tujorna är generellt mycket hårdiga, vindtåliga och anspråkslösa. Trivs bäst i en frisk, fuktig, genomsläpplig näringsrik jord. Bör inte stå extremt torrt. Trivs på ljusa växtplatser. Det finns både kraftigväxande, upprätta sorter som passar till större, högre häckar och mer klotformiga, småväxande sorter till lågväxande häckar. Tuja tål hård, regelbunden klippning, men man ska inte klippa så långt in att det blir kala grenar. Thuja plicata kan klippas hårdare och bryter om även från äldre ved. Tål stadsluft.															
- occidentalis	1-5	10-15/2-3				●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, pyramidformad
- occidentalis 'Brabant'	1-5	15/3				●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	gröna barr, tål klippning bra
- occidentalis 'Danica'	1-5(6)	0,5/0,8		●					●			måttligt näringsrik	○	frisk-fuktig	långsam	friskt gröna barr, dvärgform med rundat växtsätt
- occidentalis 'Fastigiata'	1-5	7-9/1-2				●			●			måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	friskt gröna barr, pelarformad
- occidentalis 'Golden Globe'	1-4	1-1,5/1-1,5	●	●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	ljus gula barr, klotformad
- occidentalis GOLDEN SMARAGD®	1-3	3/1,5		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gyllengula barr, koniskt växtsätt
- occidentalis 'Holmstrup'	1-5	3-5/0,8-1,2				●			●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	friskt gröna barr, kompakt koniskt växtsätt, äts ej av kaniner
- occidentalis 'Little Champion'	1-3	1/1		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	djupgröna barr, klotforma växtsätt
- occidentalis 'Little Giant'	1-4	0,8-1/0,8-1		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröna barr, klotforma växtsätt
- occidentalis 'Smaragd'	1-5	3-5/1-1,8				●			●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	glänsande gröna barr, koniskt växtsätt

Namn	Zon	Höjd/Bredd	Buskage	Dekoration/stenparti	Formklippt	Häck	Marktäckare	Småträd	Sollitär	Stadsmiljö	Samplantering	Näring	Ljus	Markfukt	Tillväxt	Allmän beskrivning av sorten; färger, frukt, bär och klippning.
THUJA forts.																
- occidentalis 'Sunkist'	1-5	3-4/1-1,5	●						●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	gröngula barr, kagelformat tätt växtsätt
-occidentalis TECHNITO™	1-5	2,5-3/1,5	●	●		●			●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, brett konformad, håller färgen över vintern
- occidentalis 'Tiny Tim'	1-5	0,4-0,5/0,5-0,75		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr, klotformad
- occidentalis 'Woodwardii'	1-5	1-1,5/1-1,5	●	●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, svagt bruna barr vintertid, tätt rundat växtsätt
- occidentalis 'Yellow Ribbon'	1-4	3/1,0		●					●		●	måttligt näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	guldgula barr, kompakt pyramidalt växtsätt
- plicata 'Excelsa'	1-4	12-15/3-4				●			●	●		näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	glänsande gröna barr, spetsigt glest kagellikt växtsätt
- plicata 'Sverige'	1-5	8-12/3-4				●			●			näringsrik	○●	frisk-fuktig	snabb	mörkgröna barr, gröngula årsskott, pyramidalt växtsätt
THUJOPSIS																
<i>Thujopsis, hiba, liknar i mångt och mycket sin släkting Thuja, men är i allt väsentligt grövre. Växer generellt flerstammigt. Trivs bäst på fuktighetshållande, men väl-dränerad, jord. Vacker med exotisk känsla.</i>																
- dolabrata	1-4(5)	9-12/4-5	●						●		●	näringsrik	○●	fuktig	normal	glänsande gröna barr, vit undersida, brett konformat växtsätt
TSUGA																
<i>Hemlocksgranen har ett granlikt, lite mer graciöst växtsätt med hängande skottspetsar och topp. Den är smal i sina ståndortskrav. Frisk till fuktig, genomsläpplig jord med mycket näring och vindskyddat svalt läge med hög luftfuktighet behövs för bra utveckling. Tål skugga, men inte stående vatten, blåsigt läge eller luftföroreningar. Hemlock tål klippning väl.</i>																
- canadensis	1-3	8-10/5-7							●			näringsrik	○●●	frisk-fuktig	normal	mörkgröna barr, vit undersida, brett pyramidalt växtsätt
- canadensis 'Jeddeloh'	1-4	0,5-1/1,5-2		●					●		●	näringsrik	●	frisk-fuktig	långsam	ljusgröna barr, dvärgform, trattformig fördjupning i mitten
-diversifolia FK MUSTILA E	1-5(6)	6-10							●		●	näringsrik	○●●	frisk-fuktig	långsam	mörkgröna barr med ljus undersida, yvigt växtsätt, hårdig
- heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E	1-4	15-20/8-10				●			●		●	näringsrik	○●●	frisk-fuktig	snabb	mjuka mörkgröna barr, hängande skottspetsar
- mertensiana	1-4	8-10/4-6							●			näringsrik	○●	frisk-fuktig	långsam	blågrå barr, slankt pyramidalt växtsätt